

第4回日本良導絡医学
 学術大会発表

井穴刺絡による所謂50肩の治験例

横浜市 浅見 鉄男

50才前後に多く発生する原因不明と言われる50肩には、大半の患者は其の痛み及び長期間(半年~2年)治らない頑固さには泣かされているのが現状です。

先生方の中には其の経験を持たれて診療に困った方もいることと思います。

たまたま、数例の患者を治療することにより、其の原因並びに治療に対して、些の新知見を得ましたので報告し、先生方の御批判を仰ぎたく筆をとりました。

最近診た患者を報告しましょう。

症例

世田〇〇 女 74才

初診 1995. 10. 27

主訴 気管支喘息 50肩

30年前から喘息に悩み、来院した患者で、其の治療途中(1995. 11. 6)に50肩を併発し、右肩痛と運動制限を訴え、夜も眠れないほどの症状を呈し何とかして下さいと泣きつかれた患者を診る仕末になりました。

治療

井刺左右 H₅F₅ (視床下部副交感神経抑制作用)を行う。

治療後、右50肩の痛みが半減し、而も肩を少し動かせるようになったという。

8/x1 右50肩の痛み殆んど良くなる。

治療 左右 H₅F₅。

10/x1 右50肩の痛みとれ、治った状態になる。肩も思うように動かせるという。

小括

1995. 11. 6~1995. 11. 10

5日間 5回治療 50肩完治

其の後(1995. 11. 14)の時点で痛み全く治り喜んでいる。

註: 喘息の症状も同時に30%位軽快している。

喘息の治療は目下継続中です。

此の間、内服薬、注射、針治療は行っていない。以上は最近の一例です。

当院の今迄の50肩患者数例について其の状況を説明し、50肩の原因及び治療法を報告し50肩に対する解説をしようと思います。(表1)

10数例の50肩患者の中から、ランダムに抽出した5例について其の発病原因及び治癒機序について説明します。

表1の如く、患者の年齢は50才前後、男性4名、女性1名、発病は長い人で2年前から、短い人は1ヶ月前で、既往歴にはじんま疹、花粉症、低血圧等。又家族歴として子供に花粉症、じんま疹等のアレルギーに関係した病症を持っていることが分る。

治療期間は、8日~35日間 治療回数5~9回、平均7日間で治っています。

治療に当り左右 H₅F₅ 井刺のみで薬剤其の他の物理的治療はしていません。

考察

50肩の患者は、50肩の症状以外にアレルギー症の経験者であり、又家族歴にもアレルギー患者がいることが多い。治療に井刺左右 H₅F₅ で、全例が治っている点から、本症はアレルギー性関節炎と考えられる。

50肩がアレルギーによると考えついた動機について

たまたま花粉症患者の治療に左右 H₅F₅ 井

刺をしたところ、患者が「実は今朝から左肩痛で困っていたところ、今の先生の治療で痛みが半分以上治った」と言うのを聞いて、それ以後50肩の患者に左右 H₅F₅ 井刺を行うと皆同じ様に治ることが分り、50肩はアレルギーによると考えるようになった。

註

50肩患者の治療が終ると大半は療みが止るが、時には痛みが少し残るとい患者がいる。この痛みの原因は、長期間50肩を治していないために、肩関節に傷がついて関節痛を起したのではないかと考えるようになり、其のための治療として、肩痛部位を通る経絡が陽経の場合には井刺 H₄H₅H₆、陰経の場合には H₁H₂H₃ 井刺を行うと痛みが非常に良くなることが分った。それ故に、50肩に対しては、治療に2通りあるということ念頭において頂きたい。

まとめ

所謂50肩の患者を診たときの態度(心情)

- 1) 患者が50肩以外の症状を持っているか否

かを確める。例えば、じんま疹、花粉症を過去に持ったか、或は現在アレルギー症があるか、又は家族歴にアレルギー患者が居るか否かを確め、もしアレルギーに関係した症状があれば、現在の肩痛はアレルギーによるものと考え治療を行うのが重要なことである。

- 2) 現在50肩の治療に当り、一般に病態解剖学的に考えているから治らないのである。病態生理学的に考えれば副交感神経異常へ進むにより発生するということが分る。従って治療として左右 H₅F₅ 井刺を行えば治るものである。
- 3) アレルギー素質を持った人が50肩を訴えたら、アレルギー治療即ち左右 H₅F₅ を行えば治りが早い。
- 4) 症例 世田〇〇 ♀ 74才の病症をもう一度見て参考にして下さい。

以上

本論文は1995. 10. 23日本良導絡医学学術大会仙台会場にて発表した論文に多少加筆した。

記 1995. 11. 15

表1 井穴刺絡による所謂50肩の治験例

例	年令	性	症 状	発病月日	初診日	既往歴	家族歴	治 療	期間	回数	効 果
1	49	♂	左50肩	2年前	5.9.18	低 血 圧 じんま疹	長男 じんま疹	左 右 H ₅ F ₅	14日	5	90%
2	51	♂	左50肩	1年前	6.12.14	花 粉 症	次男 花 粉 症	左 右 H ₅ F ₅	30日	8	90%
3	54	♂	右50肩	5ヶ月前	6.12.10	左 50 肩		左 右 H ₅ F ₅	35日	9	90%
4	46	♂	右50肩	2ヶ月前	6.11.4	花 粉 症	長男 花 粉 症	左 右 H ₅ F ₅	8日	6	90%
5	50	♀	左50肩	1ヶ月前	6.11.29	低 血 圧 じんま疹	長女 花 粉 症	左 右 H ₅ F ₅ 左 H ₆ H ₄	12日	7	100%